


KORONER ANJIOGRAFI NEDİR?

Koroner anjiyografi, kalp boşluklarının ve kalp damarlarının içine kontrast madde (bir çeşit tıbbi boya maddesi) verilmesi sırasında görüntülenmesi ve 'X' ışınları kullanılarak hareketli film çekilmesi işlemidir.

Bu işlem sayesinde kalp krizine neden olan koroner damardaki damar sertliği hastalığının varlığı ve tıkanıklık miktarının düzeyini tespit eder.

- Anjiyo bir tedavi yöntemi değil, güvenilir bir tanı yöntemidir.
- Bu işlem hasta uyanık haldeyken ve sadece damara girilecek kasık ya da kol bölgesi uyuşturularak yapılır. Bu bölgedeki atardamara kanül yerleştirilir (giriş yolu açılır).
- Plastik benzeri maddeden yapılmış ince bir boru (kateter) ile kalp boşluklarına ulaşım basınç kaydı yapılır. Kontrast madde verilerek koroner arterler görüntülenir ve film kayıtları alınır.
- Bu işlem yaklaşık 20-60 kadar sürer.
- Anjiyo sonrası 6-8 saat boyunca yatağınızda, işlem yerine (bacak ya da kol) hareket ettirmeden yatmanız gerekir.



ANJIYO ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

- Bir gün önce banyo yapınız.
- Daha iyi bir sterilizasyon sağlanabilmesi için kasık bölgesindeki tüylerinizi temizleyiniz.
- Gece 24:00' ten sonra bir şey yiyip içmeyiniz.
- Coumadin 5 mg tablet, Lixiana, Xarelto 15-20 mg, Eliquis 2,5-5 mg, Pradaxa 150 mg adlı ilaçlardan kullandığınız varsa; doktorunuza bildiriniz. Anjiyo işleminden 3 gün önce (72 saat) kesiniz.
- Şeker hastasıysanız; işleme sabah aç karına geleceğiniz için şeker ilacını içmeyiniz. Ancak tüm bu ilaçlarınızı ve kullanıyorsanız insülinlerinizi yanınızda getiriniz.
- Kullandığınız tüm ilaçlarınızı içiniz ve yanınızda getiriniz.
- İşleme gitmeden önce takma dişlerinizi, takılarınızı, ojelerinizi ve gözlüklerinizi çıkarınız.
- Değerli eşyalarınızı (yüzük, küpe, vb.) yanınızda getirmeyiniz.
- Daha önce yapılan tetkik sonuçlarınız varsa yanınızda getiriniz (EKG, EKO) raporu.
- İşlemden önce size bir onam formu imzalatılacaktır.
- Anjiyo için size hastanede verilen önlüğü giyiniz.
- Acil ve öncelikli durumlar göz önüne alınarak belli bir sıra ile işlemin yapılacağı anjiyo laboratuvarına götürüleceksiniz.
- Sizlere burada bulunduğunuz süre boyunca bizler yardımcı olacağımız için sizinle birlikte sadece bir kişinin gelmesi yeterli olacaktır.

DOKTORUNUZLA İLK GÖRÜŞME

- İlaçlarınız
- Tahlillerinizi hazır bulundurunuz.
- İlaç ve kontrast maddelere alerjiniz varsa, şeker ve tansiyon hastalığınız var ise doktorunuza söyleyiniz.



ANJIO SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Anjiyo işlemi biten hasta personel eşliğinde yatağa alınır.
- Anjiyo sonrası kateterin bulunduğu yer kesinlikle hareket ettirilmemelidir.
- İşlem tamamlandıktan sonra kasıktan kanül çıkarılır ve 15-20 dakika süre ile bu bölgeye baskı yapılır. Kanamanın durduğu görüldükten sonra oldukça sıkı bir bandaj ile kapatılır. Ancak bazı tıbbi gereklilik hallerinde kasıktaki kanülün daha uzun süre yerinde muhafaza edilmesi gerebileceğinden bu uygulama değiştirilebilir.
- 6 saat kadar yataktan kalkılmamalıdır.
- Katater uygulanan bacağı mümkün olduğu kadar hareket ettirmeyiz.
- Tuvalet ihtiyacı yataktan kalkmadan yatakta ördek/sürgü ile karşılanmalıdır.
- Öksürme, hapşırma veya başı yastıkla destekleme esnasında girişim yerine elle basınç uygulayınız.(kanamaya engel olmak için)

- Eğer kasıkta ani ağrı, sıcaklık veya ani şişlik hissederseniz elinizle pansuman yerine sıkıca basınız ve hemşirenizi çağırınız.
- İşlem sonrasında ilk saatlerde hemşire tansiyon ve nabzınızı kontrol edecektir. Bu kuraldır ve prpbem olduğu anlamına gelmez.
- İşlem sırasında kullanılan kontrast madde böbreklerinize zararlı etki yapabileceğinden ilacın hızlı bir şekilde atılabilmesi için bol miktarda sıvı almanız istenecektir (su, meyve suyu vs.). Ağızdan ilk 2 saat içinde 2 litre sıvı alınız.
- Serviste öncelikli olarak su içmeniz isteneceğinden ancak 1 saat sonra bulantı olmaması için az porsiyonda bir şeyler yiyip içmeniz uygun olacaktır.
- Durumunuza göre anjio sonrası yatağınıza dönünce doktorunuz tarafından hemen şit çekilir.
- Bu işlemden sonra kasığının üzerine kum torbası koyup 6 saat bacağınızı düz tutmanız istenecektir.
- Kum torbası alındıktan sonra ayağa ilk defa kalkarken uzun süre aynı pozisyonda yatmaktan dolayı başınız dönebileceğinden asla yalnız olmayınız.
- Kum torbası alındıktan sonra probleminiz yok ise aynı gün taburcu olabilirsiniz.



DİKKAT

Giriş yerine yakın olan kol ya da bacakta uyuşma ya da sağuma başlarsa, Bulantı, Kusma, Terleme, İşlem yerinde kanama ve şişlik olduğunda hemen hekim/ hemşireye haber veriniz.

ANJIO SONRASI EVDE BAKIM

- Evde ilk 12-24 saat boyunca mümkün oldukça yatarak istirahat ediniz tuvalet vb. amaçlı kalkılabilir.
- Anjio uygulanan bacağı mümkün olduğunca sert hareket ettirmeyiniz.
- İlk birkaç gün merdiven kullanmaktan kaçınınız. Eğer gerekiyor ise önce işlem yapılmayan bacağınızı atınız sonra diğerini yanına getiriniz.
- Öksürme, hapşırma gibi durumlarda kasığınızı destekleyiniz.
- Kateter giriş yeri çarpma ve darbelerden koruyunuz.
- 2-3 gün ağır kaldırmayınız ve araba kullanmayınız. Arabada otururken bacağınızı bükmeyiniz.
- Alaturka tuvalet kullanmayınız. Kabızlık ve şiddetli ıkınmadan kaçınınız. İşlem yapılan bacak/kolda itme ve çekme hareketi yapmayınız.
- İlk 2 gün eğilerek namaz kılmayınız.
- İşlemden 1 gün sonra ayakta ılık su ile işlem yerine ovuşturmadan banyo yapınız.
- Pansumanlarınızı varsa çıkarıp atınız.
- Kateter girdiği bölgede küçük bir düğüm kadar sertlik ve hassasiyet ertesi günü sıklıkla görülebilir ve önemi yoktur. İğnenin girdiği bölgede hafif bir morluk olabilir ve takip eden günlerde etrafına yayılabilir. Eğer sertlik ve hassasiyet artarsa veya ani şişkinlik olursa hekiminize başvurunuz.
- Kateter giriş belgesini sıkacak şekilde olan giysilerden ilk birkaç gün kaçınınız.
- Eğer koldan işlem yapılmışsa belirtilen süreden daha önce yataktan kalkabilir ve işlem tapılan kolu bükmeden hareket ettirebilirsiniz. Koldan işlem yapılmış ise o kol ile günler ağır kaldırmayınız.
- Kan sulandırıcı ilaçları anjiyodan sonra almanızda bir sakınca yoktur. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar doktor tavsiyesi ve izni doğrultusunda yeniden ilaçları kullanmaya başlayabilir.

DİKKAT

Göğüs ağrısı hissederseniz,

Kateterin yerleştirildiği bacak ya da kolda şiddetli ağrı, mavimsi renk ve soğukluk görürseniz,
Kan sulandırıcı ilaçlar almakta iseniz herhangi bir kanamanız olursa,
İşlem yerinde şişlik, morarma, kanama, sertlik olması halinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Hastanemizde 24 saat hizmet verilmektedir. Acil durumlarda veya sorularınız/sorunlarınız için mesai saatlerinde “Kardiyoloji Uzman Hekimleri”, mesai saatleri dışında ise “Kardiyoloji Nöbetçi Uzman Hekimi” ile görüşünüz.

Bize Ulaşın

444 6 462

Tel: 0 324 238 00 95 Pbx
Fax: 0 324 238 00 99

Randevu Telefon

0 324 238 63 49

Haftanın 7 günü 08:00/18:00 saatleri arasında

Turgut Reis Mah. İstiklal Cad.
No: 196-198 Akdeniz / MERSİN